



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «АЛЬТЕРНАТИВА»

410071 г. Саратов, ул. Шелковичная, 186, оф. 511. Тел: (8452) 37-67-02, e-mail: alternativa-sar@yandex.ru
ИНН/КПП: 6455055692 / 645501001, ОГРН: 1126455001155, ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Самара
Кор/счет: 30101810200000000607, БИК 043601607, Р/Сч: 40702810156000002258

ИНСТРУКЦИЯ

по применению спрея для рук с антибактериальным эффектом «СЕПТОЦИЛ»

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Средство «Спрей для рук с антибактериальным эффектом «Септоцил» (далее – Средство) представляет собой прозрачный водный раствор светло голубого цвета. В состав Средства в качестве действующего вещества (ДВ) входит полигексаметиленгуанидина гидрохлорид, ЧАСы, смягчающие компоненты. Показатель активности водородных ионов (рН) средства $7,0 \pm 1,0$. Срок годности средства - 3 года в невскрытой упаковке производителя. Средство расфасовано в полимерную тару вместимостью от 0,1 до 10 дм³.

1.2. Средство обладает антимикробным действием против бактерий, вирусов, грибов рода Кандида и дерматофитов, а также плесневых грибов.

Средство обладает пролонгированным (остаточным) антимикробным и противовирусным действием, сохраняющимся в течение 3 часов.

Средство не горюче, сохраняет свои обеззараживающие свойства при кратковременном замерзании (оттаивании).

1.3. Средство по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 при введении в желудок относится к 4-му классу мало опасных веществ, при нанесении на кожу - к 4-му классу малоопасных веществ, при введении в брюшную полость - к 5 классу практически нетоксичных веществ по классификации К.К. Сидорова. Средство не оказывает местно-раздражающего действия на кожу и оказывает слабое действие на слизистые оболочки глаз; не обладает кожно-резорбтивным и сенсибилизирующим эффектом.

1.4. Средство предназначено: для гигиенической обработки рук и небольших поверхностей.

2. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА

2.1. Гигиеническая обработка рук: 3-5 мл средства наносят на кисти рук и втирают в кожу до высыхания в течение 20-30 секунд.

2.5. Обработка небольших поверхностей: поверхность тщательно протирают тканью, обильно смоченной средством до влажного состояния. Экспозиция - до полного высыхания обрабатываемой поверхности.

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

3.1. Средство используют только для наружного применения.

3.2. Не наносить на раны, избегать попадания средства в глаза.

3.3. По истечении указанного срока годности использование запрещается.

3.4. Средство хранить отдельно от лекарственных препаратов и в местах, недоступных детям, при температуре от +5°C до +35°C.

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

4.1. При появлении признаков раздражения органов дыхания следует прекратить работу со средством, пострадавшего вывести на свежий воздух или в другое помещение. Рот и носоглотку

прополоскать водой. При необходимости обратиться к врачу.

4.2. При попадании средства в желудок выпить несколько стаканов воды с 10-20 измельченными таблетками активированного угля; желудок не промывать! Обратиться к врачу.

4.3. При попадании средства в глаза необходимо обильно промыть глаза под струёй воды в течение 10-15 минут, закапать 30% раствор сульфацила натрия.



Получено с официального сайта
НПО «Альтернатива»

Подтверждено электронной цифровой подписью
НПО «Альтернатива»